

NATIONAL STD/AIDS  
CONTROL PROGRAMME



MINISTRY OF HEALTH



ලංගින්වත  
කොළඹමූල්‍යය බහු  
ආකාශුලා

Syphilis

GC

Chlamydia

TV

GW

HSV



## ප්‍රත්‍යාමග

මෙම ප්‍රකාශනය විශිෂ්ටක්වමට මෙසමය දායකත්වය ඔබාදීන්,  
ලේඛක සෞඛ්‍ය සංඝ්‍යානයේ හි ලංකා කාරුණ්‍යාලයට  
හසුරුවාගම ස්ථූතිය ජල කරන ලදාවේ.

## කම්බඩිකරණය

වෛද්‍ය එනුඩා රෝගකාංචි

- විශේෂයෙද වෛද්‍ය ල්‍යැංඡිත රෝග

## කංක්කරණ මූලිකය



වෛද්‍ය එනුඩා රෝගකාංචි

- විශේෂයෙද වෛද්‍ය ල්‍යැංඡිත රෝග


# కప్పక

అబాసినర కుల లిఫ్టర క్రండ్ క్రెచ్చుక ఆముసు	01
అబాసినర కుల లిఫ్టర సెంచ్ క్రెచ్చుక ఆముసు	02
ల్యాంకొప సెవిట్రేషన్ వూ రెండ గ్రూ మోస్ట్ర్ బ్రెడ్	03
ల్యాంకొప సెవిట్రేషన్ వూ రెండ లో వీస శాస్ శ్రీ	05
ల్యాంకొప లోపు రెండ రో విజ్యుస్ట్ లో లు	06
<b>ప్రభుత్వం</b>	11
ను కుల లిఫ్టర్స్ డెండ్యూ	15
ల్యాంక సప్పిస్	19
లోపుర్స్ బ్రెడ్ లీస క్రెచ్చుక	23
టాబ్బోల క్రెచ్చుక	25
లోపుర్స్ కొలు లోపు లీస క్రెచ్చుక	28
లోపుర్స్ కొలు టెం టెం క్రెచ్చుక	31
ప్రైస్ మూలాస్ ఆముసు	33
ప్రాప్స్ ప్రెర్స్ లైఫ్ మోస్ట్స్	35
ప్రాప్స్ ప్రెర్స్ ప్రెస్ లైఫ్ మోస్ట్స్	37
ల్యాంకొప ప్రాప్స్ ప్రెర్స్ లైఫ్ ఆముసు	39
ల్యాంక ప్రాప్స్	42
ప్రాప్స్ క్రెచ్చుక / టెంప్	45
ప్రాప్స్ లీస క్రెచ్చుక	48
ను కుల సెంచ్ క్రెచ్చుక	51
ప్రాప్స్ ప్రెర్స్	54
ప్రెస్ ప్రెర్స్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	56
ప్రెస్ ప్రెర్స్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	58
ప్రెస్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	60
ప్రెస్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	63
ప్రెస్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	66
ప్రెస్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	68
ప్రెస్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు	72
<b>ప్రాప్స్ ప్రెర్స్ లు లోపుర్స్ లు ఆముసు</b>	74

# අභ්‍යන්තර කො බැංකිර කුරුජ කුර්ඩක අවධා



# අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කේතී ප්‍රත්‍යන්ත අවශ්‍යව



# ලිංගිකව ක්මේල්ස්ථ්‍රය වන රෝග හූ මොත්වාද?

- ලිංගිකව සම්බේජ්ජනය වන රෝග :  
ඉලිකව ම ලිංගික සංස්කරණය මගින් බෝ වේ (මෙයින් සමඟ රෝග ලිංගික සංස්කරණය නොවන මාරුග මගින් ද බෝවන අවස්ථා තිබේ හැකිය).

වෛවරය හේතුවෙන් බෝවන	වැක්තිරය හේතුවෙන් බෝවන	ප්‍රාවෝගෝව හේතුවෙන් බෝවන	චිජ්පරපෝෂිතයින් හේතුවෙන් බෝවන
<ul style="list-style-type: none"><li>• ලිංගික තර්පනය</li><li>• ලිංගික තුන්නන්</li><li>• එවැ අසිංහී</li><li>• නොඩවීම් බෝවන</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ගොජනයීයව (සුදු ඩිංදුම)</li><li>• ක්ලැම්ටිඩිය</li><li>• මධ්‍යෝනාප්ලයැස්මේන්</li><li>• සිජලය් (ප්‍රංඡනය) ගැන්නෙනුයින්, විල්. පි. ඩී. ඩී. ඩී) ගොජනයීයක්</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• වුඩ්නොලොනයක්</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• උජිනික උජිනාන්</li><li>• ප්‍රතිඵල ප්‍රතිඵල</li></ul>

## ලිංගිකව සම්බේජ්ජනය වන රෝගවල සංඝාවය පහත කරනු යැවතේ පැහැදිලි කරන්න.

- රෝග ලක්ෂණ රැහිත අවස්ථාව :  
ලිංගිකව සම්බේජ්ජනය වන රෝග බොජාමයක්, රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. එවැනින් තියෙයි ලෙස පෙනෙන පෙනෙන ලිංගික පෙදෙසක් ඇඟ පෙන රෝග කාරක තිබාය හැකිය.
- තිවිවාව යුතු කිරීම :  
සම්බේජ්ජනය වන රෝග තිවිවාව යුතු කළ නොහැකි. වෛවරය හේතුවෙන් බෝ වන මෙවතින් රෝග තිවිවාව ම යුතු කළ නොහැකි වුවත් තිසි ලෙස පාලනය කර නැතැයි.

# බ්‍රීලංකා සභ්‍රිප්‍රේත්‍යාග වෑ රෝග

- කළුන්ම නදුනොගනීම :

අවදාන පැහැරකට යොමුවෙයේ නම් භක් ඉක්ත්වෙන් පරික්ෂා කරවා සහිත ඉන්ම එදාන් වේ.

- ගර්හන් අවදියේ අවදානම :

මම ලංගිකව සම්පූර්ණය වන යොයෙකින් පෙළෙලයි නම් එය ඔබේ දරුවට සම්මේෂ්‍යමය වය නැඩා ඇතුරු සංඛ්‍යා සහ සැසින දීම උපන් ඇති විය නොවේ.

- සංක්‍රෑති :

නිසි ප්‍රතිකාර තොලදෙනෙක්, දරුණු සංක්‍රෑති සහ සොංච භාව්‍ය භාව්‍ය වෙත මුහුණ දුවට හිද වනු ඇත.

- මානසික ප්‍රවෘත්‍යාව වන බලපෑම :

මෙවති රෝගයක් ඇති වශ නැඹාගත් පසු රෝගීන් මානසිකව කඩවැවීමකට ලක් විය හැකිය වියෝගය නැංග වශ, ලේඛනාව පත්වා, සංඛ්‍යා බඳුවාව, අභ්‍යන්තරයන්ට ලක් වම, අව්‍යුත්සාහන බව, මානසික අවභින්‍ය, ඉවතා භාගන්වය සහ තෙකිනෙක දැනෙනු ඇත.

- රෝග තිබාරුණාය :

මෙම රෝග වැවින් වැළකීමට සහ බෝ වෙශ වෙත අවම කර ගැනීමට කුම අන් (A,B,C,D වැළකීමේ පිළිවෙත පැහැදුව කරන්න)



# ලිංගිකව ක්‍රේඩුජනය වහ රෝග බො විය හැකි බ්‍රුට්

ලිංගික සංස්කරණය දී



රැකිරෙය සහ රැකිර සංස්කරණය



මවගෙන් දරවාට



- ගෝති මාර්ග සංස්කරණය
- ගුද මාර්ග සංස්කරණය  
(අවධානම අධික වේ)
- හගලේෂ්‍යය (fellatio)
- ඕක්න මුශ්‍යත්තේපනය  
(cunnilingus)
- හිරින්පර කුටු හටුවලේ භාවිතය  
කිරීම
- අයුදිත රැකිරෙය සහිත  
ලිපකරණ මධ්‍යන් තුවාල  
සිදුවීම
- නිකි ලෙස පරික්ෂා නොකළ  
රැකිරය හෝ රැකිර සංස්කරණය  
මඟින්

# බ්‍රීලංකා වෛවහ රෝග වැළක්වීමේ කුට්

වැළක්වීමේ චරියාත්මක කුම :

• A. වැළකී සිට්ම

වොන වන තුරු ලංඡික ආසුරෙන් වැළකී සිට්ම හෝ වොනක සහකරුන්/සහකාරීයා මතනර සහකරුවන් සහකාරීයා සමඟ ලංඡික ආසුරෙන් වැළකී සිට්ම.



MSM / LGBT සැදුන : ස්ට්‍රෑලටර සහකරුවෙකු සෞය ගන්නා නොක් ලංඡික ආසුරෙන් වැළකීම සහ බහු සහකරුවන් සමඟ ලංඡික ආසුරෙන් වැළකීම්.

• B. අනෙක්තන ලෙස විශ්වාසවන්න විම වැළක්වීමෙන් සමඟ පොනක් ලංඡික හැකිරීම. (MSM / LGBT) ප්‍රජාවන් ද අදාළ වේ.

• C. කොන්ඩ්‍ර හාවනය  
නිවරදී ව සිම අවස්ථාවකදී තොන්ඩ්‍ර හාවනය.

• D. කල්ඩියා භද්‍රනා ගැනීම

අවදානම ලංඡික සහකාරුවන් පැවත්තුයේ නම් හානි තොන්ඩ්‍රවන් සඳහා කොමු වම මගින් රෝග හැකිරීමා භද්‍රනා ගැනීමෙන් අවසාන ප්‍රතිඵාර තොන්ඩ්‍ර ලබා ගැනීමටත් වෙයියා නිසා පැනවිය හැකි සංක්‍රාන්ත ප්‍රතිඵාර තොන්ඩ්‍රවන්, අන් දෘග වෙශ්‍යව වැළක්වීමෙන් උපකාර වේ.



ଓংগার্গুণ্য বেবা রঞ্জ বিজ্ঞানীকে গুরু



- මත්දුවෙන භාවිත කර ලිංගික සබඳතා පැවත්වීම මත්දුවෙන භාවිත කර ලිංගික සබඳතා පැවත්වීම

- දේවාදායකයින් ගණන සේවාදායකයින් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම.

- බෝරුකා වියාවත්ති කාලය බෝරුකා සියලුම පෙනී තැබූ ඇත්තේ ප්‍රමාද තැන එහෙතු ලබාගෙන බෝරුකා යොදුනු විය ඇත්තා (උදා: සුරතාන්ත්‍රය ප්‍රමාද තැන එහෙතු ලබාගෙන බෝරුකා යොදුනු විය ඇත්තා)

- ඉහළ ගෙවීමේ හෝ ටොන් වරුප්පූද මත එංගින සඩුදාන පැවතීමෙහි  
අවදානම් ටොන්ක සඩුදාන පැවතීමෙහි වලදින්න, කොන්කම් හාලින කරන්න.

# බිංගාරුත්තව ගොවන රෝග වැළැකවිලේ කුට්

- එම්.අයි.චි රෝගීන් තුළ

එකම රෝගී තත්ත්වයක් ඇති පුද්ගලයින් සොයා ගෙනිම සහ ආරක්ෂින ලංඡින ඉරුණු භාවිත කිරීම.

කොන්ඩ්‍රො භාවිතය, එව.අයි.චි වැළැකවිලේ ඉඟය භාවිත කිරීම.

- ක්ලූල සිරුම වළකාගෙන්න

භූ සංස්කරණය සඳහා ලිජිස් දුවය නාවන කර ක්ලූල සිරුම අවම කර ගැනීමෙන් රෝග මොළවමේ අවදානම අවම කර ගන හැක.

## වැළැකවිලේ පීව වැළඳාන්තමක කුම


- කොන්ඩ්‍රො ( පිරිම හෝ ගෙනිමු )

ද්වැනත ආරක්ෂණ කුමයක් ලෙස භාවිත කළ හැක.

- මුබ-යෙෂ්න ලංඡින සංස්කරණය සැදුන දන්න වේල්ල (Dental dam)  
බනුලෝ භාවිත කොට්ටේ.

- පුරුල තිවාරණ රෝග කිවාරණය : එම්.අයි.චි (PrEP)

අවදානමට නිර්වර්තාය වෘත්ත පෙර ARV ප්‍රාප්ත ගෙනිම පදනාගත් වැළැකවිලේ විකල්පයයි. විශේෂයෙන් අනාරක්ෂණ දැ සංස්කරණයෙනි යෙදෙන MSM සහ TG අය කැඳා ගො තුමය භාදුන්වා දීම වදුගත්ය.



ଓংগুরিতা লেখন রঞ্জ বিজ্ঞকবীরে ক্ষম

- ලිංගානුන්හා බෙබෑවන රෝග සඳහා එන්නත් කිරීම  
HPV එන්නතා, පොසවයටටස් වී එන්නතා, (HSV එන්නතා සහ එහිදිව එන්නත් සාලාර්ධනය මෙමත් පෙන්වා).  
**පෙන්වන්න රෝග නිවාරණ රෝග නිවාරණය**  
HIV PEP (oPEP, nPEP / PEPSI): මතඩ ARV ඉපැළ වර්ග පෙන්වන් රෝග නිවාරණය ලෙස  
බා ගා නැතිය.
  - STI - PEP පරිනෙරුවක සංවර්ධනය හේතුවෙන් පරිනෙවක දෙපෙරයමත් වන නමුත් පෙන්වන් නිවාරණ ලිංගානුන්  
රෝග වැඩෙනුවේ සායනයේම ලිංගානුන් තිරිම මධ්‍යය චේ. සිද්ධි තක්සේරු තිරිම මහ පදනම්ව ලිංගානුන් දපයෙන්දෙනය  
වලදී ප්‍රතිපැවත භාවිත කළ නැතිය.
  - වැළඳේව ලෙස ප්‍රතිකර්  
ප්‍රති ලෙවෙස ප්‍රතිකර්ය (ART) සමඟ වැඩිරිස් ප්‍රමාණය භාවුනාගත තොගයින් අවම මරවමට පත්වත්වා ගෙන යුතු  
වැළඳේ.
  - “හදුන නොගත නැති : සම්පූර්ණය කළ නොහැති” ලෙස සැලැක්.

## වැළඳක්වීමේ ව්‍යුහාත්මක ක්‍රම:


- ලිංගාග්‍රිතාව වෙශ්වන රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට මතුදිලී පර්යායක් තිරමාණය කිරීම සේවාලැනින් සහ සම්බන්ධිනා ප්‍රජාව සොන් කිරීමෙන් සහ වෙනත්කාට සැලකීමෙන් වැඩකි, සේවාලැනින්ගේ පෙන්ගැලීන්වය සහ රෘෂ්යාන්නාවය සහනික කිරීම කාර්යාලයම සහ මුද්‍රිලි සේවාවන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රතිඵ්‍යා කිරීම, ප්‍රාව්‍යාය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දේශීය වත්මලේ සහ මාර්ගෝපදේශ, SOP සාක්ෂිය සහස් කිරීම.

(මෙයට නිනිමය සහ ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම ඇතුළත් වේ).



# උරදුණය (Acquired syphilis)

ඉවම්ක පෙදුණය (chancre)



Treponema pallidum pallidum  
බක්ටිරියෝ



Skin rash  
Palmer  
syphilis  
(Snail track ulcers)  
Mucus patches  
Condylomata  
lata  
Alopecia  
lata

# පෙන්ඩොංග (Acquired syphilis)

## නැදුත්වම

පෙන්ඩොංග සුළු බැක්ටේරියෝඩ් මගින් ඇතින් ඇතින් දීර්ශ කාලීන බැලපැම් සහිත ආසාදනයකි. මෙහි වෙබ රෝග ලක්ෂණ සහිත අවදී 4 ස් නඳුනා ගත හැකිය. එනම් ප්‍රාථමික, දිව්‍යතික, ඉජ්‍යා සහ තැබ්දික අවදිය වෙශයෙනි.



## මෙර්ය කාරකය

Treponema pallidum pallidum බැක්ටේරියෝඩ

## මෙර්ය වෛද්‍ය විභාග

අනායුත්තික ටැංඩික සැබුජන්දා මගින් සහ ආසාදිත ගරහැනී මතකෙහෙන් දරවාව යෙයියෙන් සම්මේල්තුවාය වේ.

## මෙර්ය ලක්ෂණ

### ප්‍රාථමික පෙන්ඩොංග

බ්‍රාන්ඩික ප්‍රේදේරු නැති හෝ කිනිපෙයි ලෙස ඇති වේදෙනා රැකි තුවා හා වූප ගෙවී දෙන නො යුතු යුතුයි.

## ද්වැනික පෙන්ඩොංග

සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික පෙන්ඩොංග ඇති ව සහි 4 සිට 10 දකුවා කාලෝයේදී දක්න නැති මුළු ගෙරරයෝ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික පෙන්ඩොංග සම්ම පැවතීම, මධ්‍යම් තුවා මාත්‍ර ගෙනිම, මිස් ගෙක් නැලු සාම, ඇස් රුකු වෙත නා අක්‍රිත ආබාධ, ගෙරරය පුරු වූප ගෙවී ඉදිමුම, සහ මත ඉත්තන් වැනි වර්ධනය වම්, අක්‍රිත හා ප්‍රේදේරු රැකිවා සහ ස්කේරු ආබාධ වැනි ලක්ෂණ තාක්ෂණ පෙන්වුම කළ නැතියි. තුළුන් සම්මර අවස්ථා වෘත්තී ඉතා අඩු වෙශයෙන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වුම කරයි.

## ඉජ්‍යා අවදිය පෙන්ඩොංග

මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වුම නොකරයි.

## සැකික අවදිය පෙන්ඩොංග

මෙම අවස්ථාව ඉතා ක්‍රියාත්මකින් දෙන හැකි අනර ප්‍රාක්‍රියා ව කරයි. එනම් නැඳ හා චානින් සැකික පෙන්ඩොංග, ස්නායු සැබුජන් උපදෙශක පෙන්ඩොංග සහ “ගැලෝවස්” (gummatous) පෙන්ඩොංග ලෙසයි.




# ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳହିକ ଅବଦ୍ୟାଗ


Gummatous syphilis



Cardiovascular syphilis  
(aneurysm formation)



Neurosyphilis There are four different forms of neurosyphilis:  
Asymptomatic  
General paresis  
Meningovascular  
Tabes dorsalis



# ලිජදුගේ (Acquired syphilis)

## සංකීර්ණ

ප්‍රතිකාර ලක්ශීණත 40% ක පමණ තැවතින ප්‍රදෙශය දක්වා වර්ධනය වේමේ අවදානමක් ඇත.

### • රෝග වනිදිය

රෝගීයට ආදාළ ලක්ශීණ සහිත අවස්ථාව හඳුනා ගැන ලබන අතර VDRL / RPR රැකිර පරීක්ෂණ මගින් ඉලක හඳුනා ගැනීමත්, TPPA/TPHA රැකිර පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කර ගෙනිම සිදු කළයි. මට අමතර තුළාල දි හේ ඉත්තන් වහි චර්ඩවලුන් ලබාගත් සූම්පාල අනවත්තිය පරීක්ෂාව මගින් බකටටරයාව හඳුනා ගැනීමෙන් ද PCR ,TP47 Antigen ELISA පරීක්ෂණ මගින් ද මෙම අකාදානය තහවුරු කළ නැතිය.

### • ප්‍රතිකාර

ප්‍රතිකාර ප්‍රායංක ලෙස පෙනීමෙන් එහෙතු උතු අනර පෙනීමෙන් අකාත්මකතා ඇති වට වෙනත් ඡාජ්ජ විශේ වෙන පෙනී එමක වෙදි දෙයි.

### • රෝග වළක්වා ගෙනිම

රෝග ලක්ශීණ මඟවුව මය 03 කට පෙර ක්‍රමය තුළ සයුම්බන්ධා පාවත්තූ සියලුම සහකරුවන් පරීක්ෂකාර අදාළ ප්‍රතිකාර සංශ්‍ය. රෝගීය හා සහකරු දෙදෙනාගේම ප්‍රතිකාර අවස්ථා කරන තුර ලංඡින සයදානා පැවත්වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. නිසි පරිදි කොළඹ ම භාවිතය තුළේ ලංඡින සිව්ප්‍රේම්ජාය වන රෝග මොහොමයෙක් වළක්වා ගා සැකිය.


### • වැදගත් කරනු ලැබේ

මෙම රෝග තිබාවට සුව කළ නැති අතර තොකිවා තිබාදී ව ප්‍රතිකාර සම්පූර්ණ කිරීම ඉතා වැදගත්ය. ප්‍රදෙශය මවෙන් දරවාට වෙළ විය හැක අතර දරයුම් සංක්‍රාන්තා ඇති විය සැලැංු බවත් සියලු ම ගරහම් මවෙරුත් VDRL පරීක්ෂණය සඳහා කොටු කෙරේ. ගරහම් වෙමට පෙර හේ ගරහම් අවස්ථාවේ මුළු අවස්ථාවේ මුළු රෝගීය හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර වෙත්තෙන් නළ පැදාළය තුරන් කළ නැතිය. රෝගීය යුව වුවද ප්‍රතිකාර සූල ම තුළ ප්‍රතිකාර positive ලෙස පෙන්වයි.


# ଓল্ট বার্ণিন সহ কমন ইস্তেম্পে Early Congenital syphilis



Palmer and planter skin eruptions



Syphilitic snuffles



Wimberger sign



Periosteal reactions



Hepatosplenomegaly  
Failure to thrive  
Aphonic cry



# මුල් කාලීන නව ජනව උපදෙසු Early Congenital syphilis

## • හයුදින්වීම

නව ජනව උපදෙසුය යුතු උපදෙසුය ආකෘතින මතකගෙන් ගරහණී අවදියේද දරවාට රෝග වේ වෙත නිසා කුඩා දරවනට උපදෙසු රෝග වැඩිදුවයි.

## • රෝග කාරණය

Treponema pallidum pallidum ප්‍රතිච්ඡාව.

## • රෝග වෛශ්‍ය වල

මෙ කුම්භ ආකෘතින අවස්ථාවේ පැහැදිලි යෙන්න මත රඳු පවතී. මෙ ප්‍රතිච්ඡාර ලබා නොමත්කි නම්.

ප්‍රමුණ අවස්ථාවේ දී දරවාට රෝග වැඩිදීම හැකියාව (80%) කි.

නෙතින අවදියේ ලේඛන කාරණව නෑ දරවාට ආකෘතිය සැවිප්‍රේෂණය විමේ වැඩි අවශ්‍යතමක් ඇත. නවද රෝග නෙතින අවදියේ ලේඛන නෑ දරවාට රෝග වැඩිදීම හැකියාව (20%) කි.

ගරහණී අවදියේ ලේඛන කාරණව නෑ දරවාට ආකෘතිය සැවිප්‍රේෂණය විමේ වැඩි අවශ්‍යතමක් ඇත. නවද රෝග සැවිප්‍රේෂණය තුළ අවදියේ මෙන්ම දී ප්‍රාග්ධනීයේද හිදු විය නොකිය.

## • රෝග ලක්ෂණ

මුළු ස්ථාන අවදියේද රෝගය ආකෘතිය වෙමෙන් ගෙවා වේ. මෙ දී උපදෙසු නොමෙරා දී උපදෙසු මෙන්ම නව ප්‍රතිච්ඡා මෙරණ ද හිදු විය හැකිය.

## • මුළු කාලීන නව ජනව උපදෙසු (අවු : 20 අඩු)

සාමාන්‍යයෙන් දරවා ඉපදි පැවුම මාය 3 තුළ රෝග ලක්ෂණ ඇති වේ. අන්වෙනි හෝ යෙවූ පැනැල් වල සැම්මේ ඇතිවාන පෙ සැහැලු, නාසයෙන් ග්‍රොල්ප්‍රේල සුවයක් ගැවීම, ගෙරුරයේ වෛඩ සුවාන වල වැශ ගැවීම ඉදුම්ම, වයසට සැරුම් වර්ධනයක් නොපෙන්වම, අත්මාව සහ ප්‍රාග්ධන ඉදුම් වනි ලක්ෂණ ඇති වේ.

කළානුරාකින් සම්ඟ උපදෙසුන්ගේ මෙනින් පවත්තා ඇති ආකෘති ප්‍රාග්ධනීය ආභ්‍යන් රෝග තත්ත්වයෙන් දැකිය නැතියි. නව ද පළමු මාස 8 තුළද උපදෙසුන්ගේ සැක්ද සහ අස්ථි ආභ්‍යන් රෝග තත්ත්වයෙන් දැකිය නැතියි.

# ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଜ ଅବି ରଜାତ ଲେକ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରେସ (Late Congenital syphilis)



Saddle nose



“Sabre tibia” anterior bowing of the mid portion of tibia



Interstitial keratitis: produce corneal opacities, Ghost vessels



Scaphoid shape of the scapula



Mulberry/Moon's molars



Perforated hard palate



**ଲାଟ୍ କୋନ୍ଜିନିଟଲ ଶାରୀ ଶରୀରରେ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ**  
(Late Congenital syphilis)

- **පසු කාලීන තුව ජනම පෙදංගය (අවු: 20 එකි)**  
සම් ඇති වශ තුවල, අපේක්ෂ වැළ අභ්‍යන්තර පෙනෙනුවන් ආගමික තත්ත්වයෙන් (නිස් කබලේ අපේක්ෂ ඉදිරියට නොරා ප්‍රාග්ධන සහ විවෘත වූ විට), ස්නොර්ස් පැද්ධතිය ආග්‍රිත රෙග්‍රිස්තු වල අත්තවන අභ්‍යන්තර තත්ත්වයෙන්, මෙහෙයුම් දෙන් විකාශනීකාරී, මුත් සූයර්යෝගී හා ගැඹු අපේක්ෂ වල ආකෘති තත්ත්වයෙන් උදිය යැයි වේ.
  - **රෝග වෙනිග්වය**  
මුල් කාලීන තුව ජනම පෙදංගය (අවු: 20 එකි)  
යෝගීය තත්ත්වයෙන් සාර්ථක තත්ත්වයෙන් පෙන්වනු ලබමි. නොවා වමින, පෙන්වනු වෙළන, සෑවා වෙන් සාම්පූහ්‍ය අව්‍යුත්පාතිය පරීක්ෂණයෙන් අදාළ වෙන්වරයා හැඳුනා ගැනීම, මෙහෙයුම් සහ උදිරිවාගේ පරීක්ෂාවන් VDRL සහ TPPA සහ පුහුලිනා තරඟ පරීක්ෂණ මිනින් රෙග්‍රිස්තු තත්ත්වය තිරෝ.
  - **පසු කාලීන තුව ජනම පෙදංගය (අවු: 20 එකි)**  
මෙම අපේක්ෂාවේදී රෝගීය සාර්ථක ලක්ෂණ සහ මෙහෙයුම් හා උදිරිවාගේ VDRL හා TPPA පරීක්ෂණ මිනින් තහවුරු කරනුයේ.
  - **ප්‍රතිකාර**  
ඩුඩුවක ඔහුවන් දින 10 ක කාලයක් සඳහා මුදා මුදා දෙසු.
  - **රෝග වෙළන්වා ගැනීම**  
සියලුම ගෙරහැනී කාන්ත්‍රිකවන් වල් ගෙරහැනී අවධියේදී රෝගීය සාර්ථක පරීක්ෂා නිරෝ තුළුන් කෙටින් තැදුනා ගැනීමෙන් නිස් ප්‍රතිකාර ලබා දෙන් ලැබුන් නො ප්‍රතික්ෂා මෙහෙයුම් රෝගීය සාර්ථක පරීක්ෂා විට වෙළුවා ගැනීමෙනිය.

## ଓଂତିକ ଷର୍ପିଙ୍



# ලෝගික හර්සීක්

- **භාදුන්වම**  
බාංක නරපෑස් කේ බොත් බහුලව දැක්වට පෙළඳ වෙත වෛත්ති වෙත වෛත්ති මගින් ඇති කරන ලැබා ඇත රෝගයි.
- **රෝග කාරකය**  
න්ටපේක් සිම්ප්ලේක්ස් වෛත්තිය (Herpes simplex virus – type 1&2)
- **ධිප්පාඡා කාලය**  
වෛත්තිය ආකෘතින පුද්ගලයෙන් 1/3 ක් පමණ රෝග ලැක්ෂණ පෙන්වන අතර ඒ සැදුනා දින 2 සහ 2 අතර කාලයෙක් ගත වේ.
- **රෝග ලක්ෂණ**  
බහුතරයක් ආකෘතියෙන් රෝග ලැක්ෂණ නොපෙන්වයි. රෝග ලක්ෂණ ලෙස වේදනාකාරී සහ මත්තිව වූ වනුර බිඛ්ලෙ බහුතරයක් තුවාල න්‍ය ගෙනියි. ව්‍යාත් ආකෘතියය ලේ වන්නේ ලංගින ප්‍රොද්‍යුග් වන අතර ඉන ක්‍රිඩ්‍රික් මුද්‍රය අවට, ඇස් අවට සහ ඇග්‍රි වල ආකෘතිනයේ දී තුවාල ව්‍යාපාර සැට්ටි ප්‍රාග්ධනය, උන, ඇග්‍රිත වේදනාව සහ නිසර්දය ඇති වේ.  
බොමෝශ් වට මිශ්‍රිත හර්පිස් ආකෘති පුද්ගලයෙන් රෝග ලැක්ෂණ නොපෙන්ව ආකෘතියෙන් බව තොදුනේ සිට වෛත්තිය අයට ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- **රෝග විනිශ්චය**  
පුළුන වැක්කයෙන් සාක්ෂිකව රෝගය හදානා ගෙන්, ආකෘති පටක පරික්ෂාව (Tzanck smear) වෛත්තිය පෙළරස් රෝගීන පරික්ෂාව සහ ව්‍යාත් යෝගී පරික්ෂාව ලෙස HSV-PCR පරික්ෂාය සිදු කෙරේ. රුබිරෝගී පුතිදේහ පරික්ෂාව අනුම වට ප්‍රාග්ධනවත් වේ.
- **සංකීතන**  
බක්ට්‍රියා හා දුලිර මගින් තුවාල වෙ ද්වාන්ව ආසාදන ඇති වම, මානික ප්‍රොද්‍යුග් පටක ඇල්ලීම, පෙර සම දැඩිරස් හෝ ප්‍රාග් පෙළ සිරුම් අපහැසුනා, මුදා ආධිස්ථ්‍ය, රෝගයේ වෙනත් ස්වාධාන වල ආකෘතින ඇති වම, ඇස් ප්‍රදානය, මොලයේ පටල ආකෘතිය වම (වෛත්තියකිවේස් තත්ත්ව).

ଲୋକିତ ହରକତ



ପାତ୍ର ଶିଖିବାର ପାଇଁ



ଫିଲେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ



ନିବ ପତ୍ରକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିଲାମି ଏହାକିମାନ




- **Sitz bath (ଲ୍ରେଞ୍ଜ ଦ୍ୱିକରଣ୍ୟେ ହେଲ୍ଡ଼ିଂ)**  
ପରିମାଣିତ ତତ୍ତ୍ଵରେ (15-20) ଅନ୍ତର ବେଳୋଳନ ଦ୍ୱାରା (2-3) ପରିମାଣିତ ଶୁଣ୍ଡେଙ୍ଗେ ପରିଚିନ୍ତା କରିଲାମ କିମ୍ବା ଲେବାଇ

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ


- ප්‍රතිකාර වෛද්‍යන් නැංක, සේවකීන්/ ලුණ වනර සේදු, ප්‍රතිවොරය ඔහුග ලබා දෙයි.
  - ගරහණී අවධියේද හැරපස් රෝගය ආකෘතිය ව ඇති තු මෙහෙයුමෙන් වැඳිනි සිටිය යුතුය. ආරක්ෂිත සාහ වත්තායාදායා ලංඡන සංඛ්‍යා පැවත්වීම සහ තොත්තුව භාවතාය තුවින් ලංඡන සංඡන සංඡ්‍යා වන රෝගීන්ගේ කරන ප්‍රතිකර දාමය අනුගැනීම සිරිත ම එදානැයි.
  - රෝග වැඩක්ව ගැනීම
  - රෝග ලක්ෂණ පෙනීන අවස්ථාවේද ලංඡන සංඛ්‍යා පැවත්වීමෙන් වැඳිනි සිටිය යුතුය. ආරක්ෂිත සාහ වත්තායාදායා ලංඡන සංඛ්‍යා පැවත්වීම සහ තොත්තුව භාවතාය තුවින් ලංඡන සංඡන සංඡ්‍යා වන රෝගීන්ගේ වැඩක්ව ගැනීම.
  - බැඳීගෙන් සැරුණු
  - ගරහණී වෙශරස්ය පැවැත්වය වරය ආකෘතිය ව පැංචාලෙකුගේ දේහයේ ඇත්තා පෙළෙ ට එ අභිය පෙනීන ඇත රෝගීන්ගේ වරය සූජ්‍ය ව රෝග ලක්ෂණ ඇති කැංසි.
  - රෝග ලක්ෂණයෙන් පැවැත්ව රෝගී ලක්ෂණ පෙන්වීමෙන් එවැනු ට එ සහ රෝගී ලක්ෂණ ට එ අභිය පෙනීය.
  - එක් ආයුර්ධනයේ දී යායාදින මතගෙන් උදෙරවා ට එ රෝගී ලක්ෂණ ට එ දරුණු ට එ අභිය චේ.
  - එරු ප්‍රතිකර දී යායාදින මතගෙන් උදෙරවා ට එ රෝගී ලක්ෂණ පෙන්වීමෙන් එවැනු සංඡ්‍යා වෙමි අවබ්‍යන්ක ඇති.

# ഗോജോർഗ മുള ലിംഗ ശ്രദ്ധകൾ



## ഗോജോർഗ നിസ്യ അടീക്കണ സിംക്കീലനം

എൻഡ് റേഡിയ ദ്വാരാ ഫോറ്മ  
ഡാല്ലൻ എൻവിക്ഷൻ (1000x)



ഗോജോരഗകൾ വിജെറിറ്ററു  
ഉല്ലേഖിച്ചു എൻവിക്ഷൻ



മുള പ്രാണികൾ



വിശദിക്കേണ്ട പ്രാണികൾ



മുള മാർക്കേഡ് ഗുണങ്ങൾ  
ഡാക്യൂട്ട് ഫോർമ്മ



കുറഞ്ഞ ഗുണത്തിൽ ഡാക്യൂട്ട്



# ගොනොකෝරිස් මුතු මාර්ග තුළුණය (Gonococcal urethritis)

- හැඳින්වම  
පුරුෂ මුතු මාර්ගයේ ආක්‍රීතිවන ආසාදුණය වන මාරුග ප්‍රදානය නම් වේ.

- යෝශ්‍ය කාරකය :  
*Neisseria gonorrhoeae* නම්කි බෙක්ට්‍රෝකෑල

- බිජෝෂ්‍ය කාලය :  
දින 1-10 දක්වා

- යෝශ්‍ය ලක්ෂණ :  
අසාම්ප්‍රත්‍යාව යොමු මාර්ගයෙන් සැරල වැනි හාවකක් පිට වම. මුතු දැවල්ල, මුතු මාර්ගයේ වේදනාවක් හෝ අපහැසුකාවක් ඇති විම.

- සංකීර්ණතා :

පුරුෂ ගුනුව ආසාදුණය, වෘෂම්ඛලයේ නා අවධානයෙන් ආසාදුණ, මුතු මාර්ගයෙන් වෘෂම්ඛල ආසාදුණය, ලාංගිනා සම්බේද්‍යා වන තෝරු ආතරකිවේ, රෝරු පුරුෂ පෙනෙන්රැය තත්ත්වය ඇති වය හැකිය.

- යෝශ්‍ය විනිශ්චය :

යෝශ්‍යට අදාළ සායනික වනත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරන රෝගිකාරුගේ මුතු මාර්ගයෙන් ගොන්නා සාම්පූල අන්තර්ක්ෂය පර්ත්‍රිතව ලෙස කිරීමෙන්, බෙක්ට්‍රෝකෑල පර්ත්‍රිතව මින් හෝ PCR පර්ත්‍රිතවය මොන් *Neisseria gonorrhoeae* බෙක්ට්‍රෝකෑල හැඳුනා ගැන හැකිය.


- උනිකාර :

පුරුෂික ඉංජින නිසි අශ්‍රීත ලබා ගෙ සුළු අතර ප්‍රාතිකාරය සම්පූර්ණ දැයි තහවුරු කර ගොන්ම සායනා සුව විවේ පර්ත්‍රිතවය (POC) දින 03 කට පසු සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

- යෝශ්‍ය වෙළන්වා ගොන්ම :

යෝශ්‍ය පුරුෂික මුතු විවෝ සහ 02 කට පෙර ක්‍රියා තුළය සාම්බන්ධිත පුරුෂික සියලුම සාහකරවත් පර්ත්‍රිත කළ සුව අතර අවශ්‍යකවය අනුව අදාළ ප්‍රතිකාර කළ සුළුය. රෝගියා හා සාහකරු දෙනාගේම උතිකාර අවස්ථ කරන තුරු ලොංගින සාක්දානා පැවත්වවෙන වැළඳී සිටිය සුළුය. නිසි පර්දි කොන්ස්ලුම් නාවතාය තුළන් ලොංගින සාම්පූර්ණය වන රෝශ්‍ය මොනොවයක් වෙන් මොනොවයක් වෙන් හැකිය.


# ගැක්කෙල ජුවහස (Gonococcal cervicitis)



# ගැංකිලේ ජලුණය (Gonococcal cervicitis)

- නැදුන්වීම :  
නශක්‍රෙනෑලින් අයිතිවන ආසුදාය ගැංකිලේ ප්‍රදානය නෑම වේ.
- රෝග කාරකය  
*Neisseria gonorrhoeae* නාමෙන බක්ට්‍රෝකොල
- රෝග ලක්ෂණ  
අසාමාන්‍ය යෝජිත ප්‍රභාවයේ බහුලම දැකිය හැකි වේ. කාන්තාවන්ගේ පහළ උදරයේ වෛද්‍යාව, ටොරො සංස්කරණයේ දී වෛද්‍යාව, මුනා දුවුල්ල හා අන්තර් මිස් රැකිර ව්‍යාහා ඇතිවිම. සම්මර කාන්තාවන් යෝජි ලක්ෂණ නොපෙන්වයි.
- සංස්කෘතා  
භූති ප්‍රදානය, බැංකෝලියන් ගුන්වීය ආසුදානය, ලංගිනු සම්මේෂණය වන තෝර ආක්‍රිත ආතරයිටයි, මද සර් නාවය
- රෝග විනිශ්චය  
ගැංකිලේනෑලින් ගන්නා සාම්බල අන්තර් මිය පරිත්‍යාව, බක්ට්‍රෝකා රෝගියා රෝගි පරිත්‍යාය ආදිය මගින් පෝරුය තනවුරය කරයි.
- ප්‍රතිකාර  
පැනිපිටක මුළු තිසි අයුරුන් ලබා ගෙන සුනු අනර ප්‍රතිකාරය සහිතුරු දැයි තනවුරය කර ගෙනිම සඳහා සුව විශේ පර්‍යාප්තාය (100) දින 03 කට පැවු සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
- රෝග වළක්වා ගෙනිම  
රෝග ලක්ෂණ මුදුවෙන් මය 03 කට පෙර කාලය තුළ සම්බන්ධිත පැවත්තා සියලුම සහොතිවන් පරික්ෂා කර ඒ අනුව ප්‍රතිකාර කළ සුනුය. තෝරියා හා සහකරා දෙදෙනාගේ ම ප්‍රතිකාර අවසන් කරන යුතු ටොර සඳහා පැවත්තාවෙන් වැළක් සිටිය යුතුය.

# ഗോജോറ്റുവ ഫോറ്റു മൂള ലാർജ് ട്രാൻസ്




മൂള ലാർജ് പ്ലാനേ



ଓଡ଼ିଆ ଲେଖଣିକାଙ୍କ ପରିଚୟ

# ഗോജോറ്റുവ ഫോറ്റു മൂള ലാർജ് ട്രാൻസ്



മൂള ലാർജ് പ്ലാനേ



ലാർജ് ഫോറ്റു നെറ്റുവ അക്കൂട്ടുവ

# ගොනොරියෝ තොවන ප්‍රතිචාර ප්‍රතූහය

- රෝග වන්දිවය :

රෝගයට අදාළ කායනීක තනත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන රෝගීයකුගේ මුළු මාරුගයෙන් ගෙන්තා සාම්පූල නො පෙනු ඇත්තේ පැම්ත්ම්‍ය පැනව්ත්ම්‍ය මගින් මුළු මාරුගය තහවුරු කරගෙන හැකිය. CTNG, TV, Mycoplasma genitalium යනැදි PCR පැනසුකම් අඟි වට එම පරීක්ෂණ මගින් අදාළ රෝග කාරකය නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකිය.

- ප්‍රතිකාර :

ප්‍රතිකාරක සාහභ නිසි අපුරුණ් ලබා ගෙ ජ්‍යෙෂ්ඨ.

- රෝග වලක්වා ගැනීම :

රෝග ලක්ෂණ මත්තවමට මස 03 කට පෙර කාලය තුළ සම්බන්ධතා පැවත්වූ සියලුම සාන්නිරෝග පරීක්ෂා කර ප්‍රතිකාර කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ. රෝගීය හා සාන්නිරෝග යන දැඳුනාගෙන් ම ප්‍රතිකාර අවස්ථා සාර්ථක ප්‍රතිකාරක සාක්ෂි පැවත්වීමෙන් වෘෂ්‍ය සිවිය ප්‍රති කොන්සිල පාවතාය තුළෙන් ලිංගික සාම්පූල්‍ය වන රෝග කොනොරෝයක් වළක්වා ගෙ හැකිය.


# ເຕັກເກີດ ເນັວນ ທັບ ແລ້ວ ສະຫຼຸບຜາ



ຕະເລີ ແລ້ວ ປະຊາທິກ



ອື່ນຍືນ ປະຊາທິກ



Normal cervix



Cervicitis





# ගොඩෝරියාව නොවන ගැට් ගෙල ප්‍රථමය

- හැඳුන්වම :
- Neisseria gonorrhoeae හර අනෙකුත් රෝග කාරක නිසා ගැඩ්ලොලේලි ඇතිව ආකෘති වේ.
- රෝග කාරකය :
- ප්‍රමිතව සම්ප්‍රේෂණය වන Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Trichomonas vaginalis, Herpes simplex virus වැනි රෝග කාරක මගින් ආකෘතිය ඇති කරයි.
- රෝග ලක්ෂණ :
- අක්‍රූහාන් සෙක්නි සාවයේ බ්‍රූලවල දැකිය සෑකි වේ. කාන්ත්‍රවත්තයේ පහළ උදාරයේ වෛද්‍යාව, ලංගික සායන්ත්‍රයේ දී වෛද්‍යාව, අන්තර ඔයේ රැකිර වනෙනය ඇතිව ප්‍රමිතර ඇතිව සාම්බන් රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වයි.
- සංක්‍රුත්‍ය :
- ගැඩ්නාය, ලංගිකව සම්මේෂජය වන රෝග ආක්‍රිතියේ, මැසර් භාවය, පෙර්මෙනපොයිට්ස් නත්ත්වය ගැඩ්නාය ඇතිවයි.
- රෝග විනිශ්චය :
- ගෙඩ ගෙලෙන ඇනෙලන් ගන්නා සාම්ප්‍රාල පරික්ෂාව, බැක්ට්‍රේය රෝගා පරික්ෂාව, CT/NG NAAT, TV NAAT, Mycoplasma genitalium NAAT පරික්ෂාය.
- ප්‍රතිකාර :
- සාම්යක කාලයෙන සාදන ප්‍රතිඵලක ප්‍රාප්ත ලබා ගෙ යුතුය.
- රෝග වැළක්වා ගෙනිම :
- රෝග ලක්ෂණ මත්වෙම මාස 06 කට වෙර කාලය තුළ සැම්බන්ධතා පැවත්තු සියලුම සාම්කරණවන් පරික්ෂා කර ඒ අනුව ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. රෝගීය හා සාම්කරණ දෙදෙනාගේම ප්‍රතිකාර අවසන් වන තුරු ලංගික සාඛ්‍ය වෛද්‍යාවෙන් වැඳි සිටිය යුතුය.

# Trichomonas infection (ത്രിക്കോമോസ് ആക്ഷാദ്ധനം)

കുടുംബ പ്രായത്തിൽ പേരണ സഹിത യേംതി ചൗലംഗ




Strawberry cervix




# ව්‍යුක්කොලොජිස් ආකෘත්තාග

- නැදුන්වම් :  
මෙම ආකෘත්තය මරුන් කාන්තාවන්ගේ යෙන් ප්‍රභාහය සහ පුරුෂයන්ගේ මූල ප්‍රභාහය ඇති කරයි.
- රෝග කාරකය :  
*Trichomonas vaginalis* නම් කීමිකාබර ක්ෂේර ප්‍රධානයි.
- රෝග ලක්ෂණ :  
සුලභ රෝග ලක්ෂණය වන්නේ දුර්භාගයයි සහිත අභ්‍යාවතාන් සේයි සුවය දේ. කාන්තාවන්ගේ මිංහ ප්‍රොට්‍රොයේ ඇති වහා කැසීම, මූල දුවල්ල, මෑනික සංසරණයේ දී වෛද්‍යාව, අන්තර ඔස්සේ රැකිර වහනය වනි රෝග ලක්ෂණ පෙන්වයි.
- පිරිම්ත් සාම්බන්ඩයෙන් රෝග ලක්ෂණ තොපොන්වන අතර අත්මව වට මූල මාර්ගයෙන් ක්‍රාව ප්‍රවාහ, මූල දුවල්ල දැකිය නැති වේ.
- සංඛ්‍යාතා :  
පුළුල් ප්‍රභාහය, රැකිඟී කැලය තුළ තොමොටි දුර උපන්, අඩු ඔර දර උපන් සිදුවාව.
- රෝග වනිභ්‍යවය :  
යෙශ්‍යා සාවයෙන් ලබාගැනී සාම්බල අන්තර්භාගයෙන් පරිත්තා කළ වට සැපිව වෙනය වන ව්‍යුක්කොලොජ් ප්‍රවාන දැකිය නැතියි.
- ප්‍රතිකර :  
ප්‍රතිප්‍රවක හානිය දින 05 -07 න කාලයෙන් ලබා ගැන සුනාය.
- රෝග වළක්වා ගැනීම :  
රෝග ලක්ෂණ මත්‍යවාට සහ 4 කට පෙර කාලය තුළ සාවයෙන් ප්‍රවාන සියලුම සන්කරණවන් පරිත්තා කර ඒ අනුව ප්‍රතිකර කළ මුදුය. රෝගීය නා සහකර දෙදෙනාගේ ම ප්‍රතිකර අවස්ථා මූල්‍ය වන තුර මැකිකාර අවස්ථා සංඛ්‍යා ප්‍රවානවෙන් වැඩිසිටිය මුදුය.

## බකරියලු වැක්සනාකිස් (Bacterial vaginosis)




**Thin, white, homogenous  
discharge coating the walls of  
the vagina and vestibule**



## බයකරියල් ව්‍යක්ත්මොසිස් (Bacterial vaginosis)

- භාෂේන්ට්වීම් :  
Bacterial vaginosis යනු යෙහි මාර්ගයේ බෙක්ට්‍රෝකා එර්ජ්‍යනයේ වෙනසක් සිදුවීම නිසු දුරගත්තයක් සහිත යෙහි ක්‍රාවයක් ඇතිවෙමයි.
- රෝග කාර්යය :  
යෙහි මාර්ගයේ අන්තර්ගත ගෙශල ස්පේර් තුළ නිලධාරු බැක්ට්‍රෝකා වැස්ක්‍රය වෙමෙන මෙම තත්ත්වය ආති වේ. උදු:- *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginalis*, *Prevotella*, *Mobiluncus*, *Bacteroids vaginalis*
- අවධානම් සාකච්ඡා :  
අභ්‍යන්තර ග්‍රනාඡ උපත් පාලන උපකරණ. යෙහි මාර්ගය නිතර නිතර යෝදීම, නිතර ප්‍රතිප්‍රවාක ඉඟඟ ගැනීම, සහකරවන් වැඩි ඉඟඟයක් සහ සවිබ්ජනය වම, නිතර සහකරවන් වෙනස් කිරීම.
- රෝග ලක්ෂණ :  
පුලුවම දැඩිය නැති රෝග ලක්ෂණය වන්නේ දුරගත්තයක් සහිත දියරයය යෙහි ක්‍රාවයක් ඇතිවෙමයි. එංගින සම්බන්ධතාවයක් පූජු යෙහි දුරගත්තය වෙතිවෙමෙන් අති. නමුත් මෙය අධික බැසිමෙ නො ලැබු ප්‍රාදේශීය දුවල්ල අති නොකරයි.
- සංකීලනා :  
පෛශ්‍යන් ප්‍රදානය, ගර්හන් සමයේ අවසන් කාර්ඩ්‍යාව සිදුවන ගෙසාවේ, නොමෙර කළල පටල පෘත් සිදුවීම, පැහැදුව ගර්හාමයින් ප්‍රදානය
- රෝග විනිශ්චය :  
සායනික පරීක්ෂාවන් හා යෙහි ක්‍රාවයක්ගේ සාම්පූල පරීක්ෂාව මගිනි.
- ප්‍රතිකාර :  
ප්‍රතිප්‍රවාක ඔඩාඡන ලබා දීම යෙහි මාර්ගය තුළට ඇතෙන් කරන ඔඩාඡන ලබා දීම සිදු කරයි.
- රෝග වළක්වා ගනිම් :  
යෙහි මාර්ගය යෝදීම සඳහා පැමුදු, ව්‍යෙශ්‍යාපනය දියර වර්ග යෙදා ගැනීම හෝ නිතර නිතර යෝදීම / ආයෝග කිරීම කොරිය තොකු ප්‍රතිකාරය. එංගින සහකරවන් ග්‍රනාඡ සීමා කළ යුතුය.

# ඉංගාරුත කැන්සිඩා දුල්ල ආකෘතිය (Candidiasis)



කිරීතලදී කැන්සිඩා දුල්ල ආකෘතිය

යෙත ප්‍රතිත කැන්සිඩා දුල්ල ආකෘතිය

ଓঁ গুরু শ্রী কানকদুর্গা (Candidiasis)

## ලිංගික ඉන්නන් (Genital Warts)



# බ්‍රිංගික ඉන්හන (Genital Warts)

- **භාදුන්වම :**  
ප්‍රාගික තෙන්නන් යෙහි Human papilloma virus වෛටරයේ ආකෘතිනය නිසා මෝනිටින ප්‍රාදේශ වල සැම් සහ ගේල්ස්මල එප්පල ආභ්‍යන්තර දැක්වන හැකි අක්‍රිත වර්ධනය වීමේ වේ. ඕංගිකව සම්පූර්ණය වන පෝග තාන්ත්‍රවාචක.
- **රෝග කාර්කය :**  
Human papilloma virus
- **ඩිපෝෂාපත්‍ර කාලය :**  
සාමාන්‍යයෙන් සහ ඊ සිට මාස පික කාලයකි.
- **රෝග ලක්ෂණ :**  
ඩායිර තෙන්න මෝනිටින ප්‍රාදේශ වල සැම් සහ ගේල්ස්මල පටල ආභ්‍යන්තර තනි සෙන් බහු ගුවන් වයෝගීන දැක්වන හැකිය. අනෙක්නර තෙන්න මුළු මාරුගයේ, ගබ් ගෙළ ප්‍රාදේශයේ, දැය ආභ්‍යන්තර සහ උග්‍ර ඇති විය හැකිය.
- **සංකීලන :**  
සම වර්ෂය වීම, තුවාල වෙත හා අධික ලේ ගෙම්මෙ, ගැඹ ගෙම පෙළක
- **රෝග විනිශ්චය :**  
ප්‍රධාන ව්‍යුහයන් සායනිකව රෝග විනිශ්චය කරන ලදහා අනර ද්‍ර්යකර අවස්ථා වලදී පෘත්‍රාන් පටක පරිභ්‍රමාව සිදු කෙරේ.
- **ප්‍රතිකාර :**  
සාමාන්‍ය කාලයෙන් සහෙ ඉවේ පූව විය හැකිය. ප්‍රතිකාර ලෝක 70%-90% TCA ආලේප කිරීම, සාමාන්‍ය ව්‍යුහයෙනයි. ව්‍යුහය විකින්සාව, 5% Imiquimod ආලේප කිරීම හෝ ගුළු කර්ම මගින් තුවන් කිරීම යොදායු සිදු කෙරේ.

# ලිංගික ඉන්නන් (Genital Warts)

මුබයේ මත්තන්



කිරීනයේ ඉන්නන්



යෝනි ආක්‍රිත ඉන්නන්




ගුදය ආක්‍රිත ඉන්නන්



## ଓংগিক দুর্বলতা (Genital Warts)

# විෂය කෝජ ප්‍රදානය / ගුදීලිල (Epididymo-orchitis)



# ପାଶରୀ କୋଣ ତଥା କୋଣ ପାଶରୀ / ଏଡିଡିମୋ ଓର୍କିଟିସି


- **නොයින්වීම :**  
වැඩෙනය හා / හෝ අලුවත්මෙයේ සිදුවන ප්‍රදානය තත්ත්වයකි.
  - **රෝග කාරකය :**  
*Neisseria gonorrhoeae*, සහ *Mycoplasma genitalium* වනි රෝග කාරක වයස 35 ට අඩු මැයිබඳ සැකිවූ පරිම ප්‍රදේශයේ අනුර බෙංචුව ඇත . මුළු ආකෘති අනිකිතර් *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas aeruginosa* වනි බක්ටෙරියා ද වැන්ම කොම් ප්‍රදාන රෝග කාරක අනර වේ.
  - **රෝග ලක්ෂණ :**  
ඉදුමක සිනිව හෝ රිනිව ඇතිව වැන්ම කොම් වෛද්‍යනාව, මුළු මාරුකෝන් ප්‍රාවයක් යෙලීම, මුළු මාරුහැයේ ඇති වන වෛද්‍යනාව, මුළු දැවැල්ල, තිනර තිනර මුළු පා නිරුමේ අවශ්‍යතාවය යොදායු ඇත වේ.
  - **සංකීර්ණී :**  
වැන්ම කොම්යේ ආකෘතින්හි ලෙස තරු පිරි හා සැසර පිරි ම
  - **රෝග වනිශ්චය :**  
සැකිවිත සිනියරන පරික්ෂණ මගින්, සිනිමය කැරැකිලෙන් ඇතිවන torsion of the testis හන්ත්වයෙන් තොවන බව (අවශ්‍ය නම් scan පරික්ෂණ වනින්) හැඳවුරු කර ගෙ ශ්‍රීං. රෝග කාරකය හැඳුන ගැනීමට ප්‍රාවයේ අන්විතම් පරික්ෂාවක් හෝ බක්ටෙරියා රෝගාක් විරෝධක් හෝ PCR පරික්ෂාවක් සිදු කළ හැකිය. මුළු ආකෘතියෙක් තම් එ සැදුනා මුව පරික්ෂාවක් හෝ බක්ටෙරියා රෝගාක් විරෝධක් සිදු කළ හැකිය.

# ବୀକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦୟନ୍ତ / ଏଡିଡିମୋ-ଓର୍କିଟିଜ୍ (Epididymo-orchitis)

- **ප්‍රතිකාරී :** ප්‍රතිකාරී අඟුත්ත තිබූ අදුරින් සහි 2 ක කාලයක් සඳහා බව ගෙන යුතුයි. අවශ්‍යතාවේ වේදනා නායුන අඟුත්ත බො දෙනු ලබන අතර ප්‍රමාණවල් විවේකය ඉන් වැඩගත් වේ.
  - **රෝග වලක්වා ගැනීම :** ලිංගික රෝග නෑත්‍යවාසක් නෑම්, රෝග ලක්ෂණ මත්‍යම මාස 3 කට පෙර කාලය ඇල සම්බන්ධ නායු ප්‍රතිකාරී සියලුම සාක්ෂාත්වන් පරික්ෂණ කළ යුතු දිනර අඟුත් ප්‍රතිකාර කළ යුතුයා නා සාක්ෂාත් දෙදෙනාගේම ප්‍රතිකාර අවසන් කිරී තුරු එය ලිංගික සාක්ෂාත් ප්‍රතිකාරී ප්‍රතිකාර නිසි පරදී නෑත්‍ය නෑත්‍ය ප්‍රතිකාරී සාක්ෂාත් තුරු එය රෝග වැඩකි හිඳු යුතුයා නිසි පරදී නෑත්‍ය නෑත්‍ය ප්‍රතිකාරී සාක්ෂාත් තුරු එය රෝග බෙජා මෙයක් වලක්වා ගෙන නෑයියා.




# ഗ്രേഫി ശ്രദ്ധക്ക്



# ගුරුත්‍රේනි ප්‍රදානය



- හැඳින්වම :
- සෞඛ්‍යී ප්‍රදානය යන කාන්තා ප්‍රජනක පද්ධතියේ තෙහෙල කොටසේ දායාදාන තත්ත්වයකි.
- රෝග කාරුණය :
- බිංඩවල සම්පූර්ණය වන Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium මේ තත්ත්වය ඇති කරන අතර, යෝගි මාරුගය ආක්‍රිත තිරණායු බැක්ට්‍රේරියෝ හේතුකාරක වේ.
- රෝග ලක්ෂණ :
- කාලාන්ත්‍රයන් හේ බිංඩවලයේ සහ යෝගි මාරුගලයන් අයුලාභය ණ්‍රාවයේ කිවිම සුලබය 38 °C වැඩි උන්. බිංඩවල සම්බන්ධතා වලදී ඇති වන වේදනාව, අයුලාභය රැකිර වහනය, ඔකප් දීන වල ඇත්තාන අධික වේදනාව.
- සංක්‍රාන්තා :
- පැහැදිලිය නාල වල පැමිසි ගැනීම, පැහැදිලිය නාල වල අවහිතතා, ප්‍රජනක පද්ධතිය ආක්‍රිත සැර ගෙවී, මිශ්‍ර භාවය, කල් පෘතින සැරබා වේදනාව.
- රෝග විනිශ්චය :
- කායික්කල පරින්තා තිරිණීදී ගෝනායය, ගැඩිගෙල ආක්‍රිත වේදනාව රෝග විනිශ්චය සඳහා වර්ද්‍යාත්මක පැවත්තාවෙන් පැවත්තාව, රහ අමත්තය 38 °C වැඩි උන තෙහෙල ESR හා CRP අයයෙන්, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis එහි රෝගකාරක පැහැදිලිය රෝග විනිශ්චය උපකාර වේ. පැහැදිලිය නාල වල පැමිසි ගැනීමක් හෝ වෙනත් ගෙෂයලේදා හඳුස නැත්ත්වයන් නැති බව තහවුරු කරගතිම ඉතාවදානගත්ය.





ଭାରତୀ ଭାଷାରେ

# ଅଣ୍ଟା ଲାର୍ଗ ଟ୍ରେନ୍



# අඟඩ මාරුග තෙවකය

## • හැඳුන්වම :

අයේ මාරුග පළුහය යුතු ගුද මාරුග බිත්තියේ පැකිවන ආකෘති නත්තුවයි.

## • රෝග ක්‍රියා :

ලොංකීබ සම්පූර්ණය වන Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (LGV ආතිතරන වර්ගය ආනුවු), සිල්වස් බක්ට්‍රෝය, පැලිලො හා හැඳුන්වයේ වියරස වහි රෝග කාරුන මේ තත්ත්වය ඇති කරයි. රෝ අමතර ලිංගික සම්පූර්ණය වන රෝග නොවන, ආනුරුත රෝග කාරුක වන shigella හා salmonella වහි බක්ට්‍රෝය. සම්බුජා සම්බුජා පෙන්වන පිරිම අතර මේ තත්ත්වය ඇති කරයි.

## • රෝග ලක්ෂණ :

ගුද මාරුගයෙන් සුරය සහිත අසාම්පාන සාම්පාන එවත් ප්‍රමුඛය. එළ සිනි ප්‍රාවාස් ප්‍රාවාස්, ගුද මාරුග අවස්, කුසිම, ගුද මාරුග අනුලත චෙනුව, මෙහෙ ප්‍රාවාස් ප්‍රාවාස් සහ මුළුදුය දකිනය ඇති අනෙකුත් ලක්ෂණයෙකුය.



## • සාංක්‍රාන්තික :

නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබුනුහොත් ගුද මාරුග බිත්තිය හානි ව එය දුඩී විම, රිස්ට්‍රුලා ඇති විම සිදුවිය හැක. මෙයට අමතර ගුද මාරුග ආභ්‍යන්තර ප්‍රතිඵානක ලොංකීබ සම්බුජානා පොත්තන පුද්ගලයෙන් HIV සම්පූර්ණය වලුව වැඩි අවදානමක් පවතී.

## • රෝග විනිශ්චය :

සායනිකව පරික්ෂා කිරීම සහ ගුද මාරුග ප්‍රතිඵානිය පරික්ෂණ රෝග විනිශ්චය සුදානා වැදගත්ය. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis හර්පස් රෝග කාරුක හඳුනාගැනීම සැදුනා විශේ පරික්ෂණ සහ සිල්වස් පැකිවන තැනුණුනිම්ව VDRL, TPPA පරික්ෂණ උපකාර වේ.

# ခုခံ ဝာပေ အန္တ အုပ်စု



# අභේ තාරග ප්‍රදෙශ


- උතිකාර : සංඛ්‍යාව වළකුව ගනිවට ඉස්මතීන් උතිකාර සඳහා දොළව වදුගත්. එකිසෙක නො ප්‍රතිච්‍රියා මූල්‍ය අදාළ රෝග කාරකය අනුව ලබ දෙයි. රෝග කාරකය හැඳුනානීවට අපහු නම් චකාන් සෑක කරන ගෙනුවට ඉතිකාර කිරීම සිදු කරයි.

- රෝග වළක්වා ගැනීම :

වර්තමාන සන්කරණ ල්‍යිංකාව සම්පූර්ණ ජාය වන රෝග සඳහා පරීත්තා කළ යුතු, අතර අධිකාරී ප්‍රදෙශ වළදී ආනතේ ලංඡකට සම්පූර්ණය වන රෝගයේ තියා නම්, පැහැදිලි මූළු 3 භාවිත සන්කරණ ව දැනුම් දී රෝග තිරිස්මෙන් හා උතිකාර සඳහා දොළ නො ඇත්තායි. දෙදෙනාම මාජය සම්පූර්ණයෙන් හාවතා කර ඇතුළත් වන තුරු ලංඡක සම්බන්ධතා නොපැවත්වීම වදුගත්ය.




# භාව ජනම අක්‍රමී තදුනය



ගැටින ස්ටෝනොලය



සුදු පැහැති පරලය



සුදු පැහැ දැලෙන්සුදු ප්‍රාථමය  
(Ct)




සයරල බැති ක්‍රාවය

# නව ජනව අක්සි පුද්ගලය

- භැඳීන්වීම :  
නම ජ්‍යෙන් උදරයවත්තේ ඇසුවල ඇතිවන ආකාදන කත්තවයි. දරවා බිජිව මූල් දින 28 තුළ ඇතිවය හැකිය.
- රෝගය සම්බුද්ධුවය වේ :  
ආකාදන මවත් යොනි මාර්ගය තුළින් දරවා බිජිවමේ ආකාදන ඇස් සමඟ ස්පර්ය විමෙන් දරවා ආකාදනය විය හැකිය.
- රෝග කාංක් :  
ල්‍යින්කෘ සම්ප්‍රේෂණය වන Neisseria gonorrhoea , Chlamydia trachomatis සහ herpes simplex යෙ ව්‍යව්‍ය මගින් වැළඳිය හැකිය.
- පුරුව ආකාදන කාලය :  
Neisseria gonorrhoea දින 2-6, Chlamydia trachomatis දින 5-12, HSV දින 6-14
- රෝග ලක්ෂණ :  
පුදරවාගේ ඇස් වලින් සාරුව වැනි ආකාදන ගැලීම ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණයයි. මෙම නත්තනවය ඇස් දැකෙනිම නො එක් එක් ඇසුක ඇතිවය හැකිය. ඇස් වල ගැලීම සහ පුදු පැහැති පොලයක් බඳු නිමෙම, ඇස් පිළාවුව ඇතුළු පැත්තෙන් ගැටින වැනි ස්වභාවයක් දක්නට ලැබීම අනෙකුත් ලක්ෂණ වේ.
- සංකීර්ණය :  
දරවාගේ ඇස් වල කැඩිනිකාවට හානි සිදුවීම නිසා සාදාකාලික පෙනීම ආහු වම නො අන්ද භාවය ඇතිවය හැකිය.

# භාව ජනම අක්මී ප්‍රදානය




ගැටින ස්වංසයට



පුද් පෙනෙනි පටලය



පුද් පෙන අඡෙනොසුල ස්වංසය  
(CT)



සෙරල චැනි ස්වංසය



## නැව ජනල අක්සි ප්‍රදුෂණය

### • රෝග විනිශ්චය :

දරවාගේ ඇය වලින් මධ්‍ය ගත්තා සාම්පූල මිනිෂ ගොනොරියා විභැංචිය සාදනා අන්තික්සිය පරීක්ෂණය සහ වැක්වෙයා රෝගී පරීක්ෂණ පරීක්ෂාව කිහි කෙරේ. නවද නැස්‍ය පිටපෑ කොටසෙන් සහ ගැං මාරුගෙන් මධ්‍යගත්තා සාම්පූල සාදනා ද එම පරීක්ෂණ කිහි කරනු ලැබේ. *Neisseria gonorrhoea*, *Chlamydia trachomatis* සහ herpes සාදනා PCR පරීක්ෂණ ද කිහි කළ හැකිය.

### • ප්‍රතිකරු :


උනිසොක ඉංජින විදින බෙහෙන් ලෙස සහ සිරස් ලෙස ලබ දෙයි.

මුළු දින වල සේලසින වනුර වලින්, සාම වනාඩි 30 කට වරෙන් ප්‍රාවෘත් ලබන් වන තුර දරවාගේ ඇයේ සේලිම එ පැපුව පැය දෙකකට වරක් දරවාගේ ඇයේ සේලිම ද කිහි කළ ප්‍රතිය. නවද මෙනෑල දරවාගේ ඇයේ තැදින් ස්පර්ශ කිරීම කිස් වෛක්කන් නොකළ යුතුය. වෛද්‍යවාරයෙන් තියෙම කඩන පරිදි දරවාගේ නිස් පරිද සායනයට රෙහෙන ඒම අනුවරුය වේ.

### • රෝග ව ලක්ඛා ගැනීම :

දරවාගේ දෙකකියෙන් ලිංගික ස්විල්පුහාය වන ආකාශන සාදනා පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිඵල වලන් ස්වායක්තාව මුවන්ව ගොනොරියා සහ ක්ලු.ච්‍රියා සහනා ප්‍රතිකාර ලබාදීම. මට ඔදුර ගැන්නා හාවයෙන් තුළ දී අන්තිවාරු ලංගාග්‍රින රෝග පරීක්ෂණය යොමු වෙ වඳුන්නය.

## ଚାନ୍କ୍ରୋଡ଼ୀ (Chancroid)



**Haemophilus ducreyi**  
ଅଶ୍ଵଳକ୍ଷିତ୍ର ଆଶ୍ଵଳଦୟ



School of fish  
appearance



ଉଦ୍ଧବତତ୍ତ୍ଵିତ ବୃକ୍ଷାଳ ଲାଗୁ  
କ୍ଷୋରପଦ୍ଯ



Penile Chancroid with  
bubos

## ଚାନ୍କ୍ରମେତ୍ରିକ୍ (Chancroid)

- පැදිංච්චරු : ආකාරයක් වන අනර ලංජුග්‍රීතාව ඇත්තේ තුවාල තත්ත්වයක් සහ ව්‍යාග්‍රහණ ඉමුවක් වෙත දක්නට හැකිය.
  - රෝග සම්පූර්ණය වෙත :  
අනාරක්ෂිත ලැංඩික සඳහා සම්පූර්ණය වය හැකිය.
  - රෝග කාරක ව්‍යුත්තාය වෙත :  
Haemophilus paracreyi නම බැහැවරුයාව.
  - බැහැවන කාලය :  
දින (n. 7) දක්වා කාලයකි.
  - රෝග ලක්ෂණ :  
ලංජුග්‍රීතා ක්‍රියාත්මක වෙත තුවාලය දී කිහිපයක් තෙවැනිකාරී හැකිරුණු තුවාලයක් හෝ කිහිපයක් ලෙස පර්ධනය වය හැකිය. එසේ සහ ම තැක්විය පර්දේශයේ කුදාලට වෙ මෙරුමක් හා තරඟය පිරිවෙන් දකු හෝ හෝ පර්ධින්හා තිරෝදු එකකාකාර තොටෙන මධ්‍යමක් සහිත නියුත සහිත මධ්‍යමක් හොඳුනී, වෙත ඇතුළත සඳහා තුවාල වෙත දකු ගෙ හැකිය.
  - සංක්තුලතා :  
පෙර සහ ප්‍රස්ථාපන ගැනීමට හොඳුකි Phimosis තත්ත්වය ඇති විට, තුවාලය ආග්‍රිතව පවත වනාය වම, සමෘතර වෛටෙක තුවාලය පෙන්ම මාය ගොනාවන් හෝ වර්ෂයක පමණ ගෙ විම .
  - රෝග විනිශ්චය :  
රෝගය අදාළ සායනික තත්ත්වයක් පෙන්වාම් කරන රෝගින්ගේ තුවාල මෙහෙන හෝ ආකාරීන ව්‍යාග්‍රහණ සාම්පූර්ණය පරික්ෂණය මගින් රෝගය තහවුරු කරයි.
  - පැනිකාර :  
ප්‍රතිපාදන සායන ලබා දේ. අවශ්‍ය ව්‍යාග්‍රහණ හොඳුවයක් ඉවත් කිරීම (aspiration) සිදු කළ හැකිය.
  - රෝග වැක්වා ගැනීම :  
රෝග ලක්ෂණ මත්වීම දීම (10) කට පෙර සිට මේ දක්වා කාලය තුළ සම්බන්ධතා පවත්වා සියලුම සහකරණවන පර්ධිනා කළ යුතු අනර ප්‍රතිප්‍රේල ව්‍යාග්‍රහණ ව ප්‍රතික්‍රියා සහ ප්‍රතිකරු හා සහකරු දෙපෙන්ඩාවෙන් ප්‍රතිකරු අවස්ථා කරන තුරු බැංගින සඳහා ප්‍රවාන්ත්වෙන් වැළඳී සිටිය යුතුය. ආරක්ෂණික සහ ව්‍යාග්‍රහණ මිශ්‍රිත සඳහා ප්‍රවාන්ත්ව සහ නිස් පර්දී කොෂ්ඨ්ම හාවනය තුවාන් ලැංඩික සම්පූර්ණයක් වන රෝග වැළඳී ව්‍යාග්‍රහණ ගෙ හැකිය.


# බ්‍රීලංකා විශේෂීම් ආකෘතිය

ප්‍රාථමික අවධිය

දේහික අවධිය



කෘතික අවධිය (genito-anorectal syndrome)




Peno-scrotal  
lymphoedema

Lymphoedema vulvar (esthiomene)

Lymphoedema of the  
scrotum

ପାଇଁକୁ ଲୋଗିନ୍ କୌଣସିବାରେ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ତିକାରୀ

## ග්‍රැනුලොමිනෑන්සිස් (Granuloma inguinale)



සෙසල තුඟ කිවින බැක්ට්‍රිලයා



Safety pin appearance of the organism within the histiocytes




Granuloma inguinale in different sites



ପ୍ରକାଶକ ମେଳିତିକା

# පත්‍ර තොර (Scabies)

## පත්‍ර තොර උමග



අතිරිම : අභ්‍යලේ තර දනරල් මෙන් කටුව හා වෘත්තීය ප්‍රජ්‍යෙනයේ, තිබුණ හා තිබුණ, දේහාය, වෘත්තන කෝස හා ඕංගයාදින සම්ඟ, තන ප්‍රංශ, නානිය කළ සහ කට්ටම ප්‍රංශයේ


## පත්‍ර තොර යෙළි



## දේහාය දී



## (පත්‍ර තොර)



## ඡන් තොරු(Scabies/ Pediculosis pubis)

- හැඳිනවීම :

වතු තොරු යුතු වියේමින කුඩා මසිටාවකු නිසා සම් අති වන ආකෘතියකි.
- රෝග ක්‍රියාකාරය :

*Sarcoptes scabiei var.hominis* ප්‍රධාන වශයෙන් සම්පූර්ණය වන්නේ ආකෘතියෙකු සමඟ ස්පර්ජ විමෙන් හෝ ආකෘතියෙකු විසින් ප්‍රධාන කරන ලද ඇදුම් තුව ස්ක්වෑච් හා විනිහෙකි.
- බිජෝත්තා කාලය :

ප්‍රාථමික ආකෘතියෙකු යන් 3-කී කාලයක් වන නමුත්, නාවන ආකෘතියෙකු බිජෝත්තා කාලය කෙටි වේ.
- රෝග ලක්ෂණ :


සම් අතිවාන අධික කියීම් (උරුමෝදේ වඩාත් හිඹු වේ). රුණ ප්‍රතියෝග තුරු බිඡිල්, තුවාල හා සම අනුලෙන උවාල හා සම අනුලෙන උවාල හා ප්‍රාථමික ස්ක්වෑච් ප්‍රතිකාලීන මෙවැනි විශ්වාස ප්‍රතිකාලීන මෙවැනි විශ්වාස දැන ගත හා හතිය.
- සාංකීර්ණතා :

අධික තොරු නිසා අතිවාන තුවාල, ද්වත්තිකා බෙක්ටිරුකා ආකෘති, ද්වත්තිකා දීද, වකුනු ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයන්
- රෝග විනිශ්චය :


රෝග ලක්ෂණ ස්ලකා වල සායනිකව රෝග විනිශ්චය කරයි. දියර පැරුණින් හෝ තොල්වල භිල්වන ලද සාමේ පටක කොටස් අන්විත්තිය පරිත්තාව මින් මසිටාවන, සිටෙයන්, බිත්තර හැඳුනා ගැනීමෙන් රෝග තත්ත්වය කළ හැකිය.

# පතු හොර (Scabies)

## පතු හොර උමග



## පතු හොර ගවේ



## දෝතික දඟ



(පතු හොර)




පතුරුම : පතුරු කාරු අනුරුදු සෙක්ස් නැවුව හා වෘත්තීය ප්‍රංශයෙන්, කිහිප හා ඉතිල සෙක්ස් යා, එමගින් කොළ හා බිංජා ප්‍රාග්ධන සම්බන්ධ වන පතුරු, ආහිය, හෙළ සහ තට්ටම පැද්දෙයේ.


## **சுத்தி கோரி**

(Scabies/ Pediculosis)

# බ්‍රීලංකා සම්බන්ධතාව වහා උක්තු ආකෘතිය



*Pthirus pubis* දැක්වීමෙහි ආකෘතිය




# බැංකික කේඛලුදෙනාය වහා උක්තු ආකෘතියන්

## Pediculosis pubis

- නැගැනීන්වීම :  
මනිසා ගේ ලැංඡලින සෑම් බහිත්පරයෝගීතා උක්තුන් වෙශෙනුයෙක් මගින් අඩු කරන ආකෘති තත්ත්වයකි.
- රෝග ක්‍රාරකිය :  
*Pthirus pubis* (pubic or crab louse)
- රෝග ලක්ෂණ :  
සම් ඇතිවන ව්‍යාධීම, දුට්ටුල් සහ රූල වෙළ දැකිය නැතිය. අඩු බාල හෝ අයි විනාශී වල ආකෘතිය ඇතිවෙතෙන අක්‍රම අසාමාන්‍යතා ඇති වේ. පරිභාෂා තුරුම්පින් වෙතු, අඩු වෘත් සහ අස්ථි මිනාඩු වල මුලුවේ උක්තුන් හා බිජ්‍යන් දැකිය නැතිය. සම්බන්ධක් තිබියි රෝග ලක්ෂණයක් නොමෙන්වයි.
- ස්‍යාංචුලතා :  
ද්‍රව්‍යකාන වෙනත් පරිදි ආකෘති, අක්‍රම රෝග තත්ත්වය
- රෝග විනිශ්චය :  
පෙන්නාම් කරන හොරුතුරු සහ ලක්ෂණ අනුව සායනික රෝග වනිශ්චයකට එම් එම මුළුයෙනි අඩු බ්‍රන්නර හෝ උක්තුන් අන්විත්මය පරික්ෂණය මගින් තහවුරු කරගෙන හැකිය.
- ප්‍රතිකාර :  
උරුය සේඛ් පිරිසිය විශේෂ පසු පර්මොලින් හිමි කෙළෙල් හිමි පහැලට සම්පූර්ණ හෙරෙරල් (පුළුල සහ සියලු ඇග රෝග අනුලෝචන ආලේප කොට පැය 8 කිට 12 දක්වා කාලයක් සමඟ රැඳෙන්නට ඕනෑම හැරුය ස්ථානය වෙත් පසු ගේරුය හොඳින් සොදු පරිසිය ආදාම් පින් අඩර ඇඳ සිට් ඇඳම් මෙන්ම පාවත්වා කරන ලද ඇඳ ඇතිරාල්, තුවා යොදායි තවත් වනුවර් තුවීබා, සේදා, ණල අවල විභාග ගැනීම තෙව වයුදුගෙන්ය. සේදා තොනික් ආදාම් පැය 72 ක් ප්‍රාග්ධන හැඳුනු ලැබා තොනික් වැඩා ප්‍රාග්ධන යුතුය.

# බ්‍රීලංකා කමිට්‍රේස්ඩ වහ උණු පෙනුව ආකාර්ථිකය



බයෝග මූල්‍යතාත්මක දායි විනිශ්චය

# බංගිකව සම්බැජනය වන ලේඛු අක්කාද්‍යනය

## Pediculosis pubis

- ඇයේ ආංශින ආකාදන සඳහා ප්‍රතිකර :

ඇයේ වසාගෙන 1% පරමෝනින තීම ඇයේ පිළිපි වල අලේප කර මිනින් 10 කට පසු සේදා හාරම සිද කළ යුතුය.

මැලෙකින් 0.5%. දියර වයළේ කොස් යැදැහා ආලේප කර අව වශයෙන් පය 2 කට පසු සේදීම කළ යුතුය. වහාන් සුදුසු ව්‍යකින් (පය 12) පසු සේදුමය. දින 3-7 කින දෙවනවර ආංලේප කළ යුතුය.

රෝම වම සහ ඕනෑම් ප්‍රධැයුයේ රෝම බම ලක්ෂණීන් ඉවත් කර ගැනීමට උපකාර වේ.

ප්‍රතිකර ලබා දී සැකියෙකට පසු නවත පරික්ෂා කර බැවා උක්ෂන නොමති බව නහුරු කිරීම වයුදෙනයි.

### • රෝග වලක්වා ගැනීම :

යෝග ලෙස්ත්ම මුන්ඩ්වල මාය 03 කට පෙර කාලය තුළ සම්බන්ධ පාවත්තු සියලුම සැහකරවන පරික්ෂා කර ඒ අනුව ප්‍රතිකර කළ යුතුය. රෝගීය හා සහකර දෙදෙනාගේ ම ප්‍රතිකර අවකන් කරන තුරු මූංජික සබඳතා පාවත්වීමෙන් වැළැක සිටිය යුතුය.



## ເລົງຊັກຕົ້ນ ຄຫວະເຂດສິນຕົ້ນ (Molluscum contagiosum)





# බොලෝස්කව් කන්ටෙස්ඩ්ස්ව්

- **හැඳුන්වීම :** මොලුස්කම් කන්ටෙස්ඩ්ස්ව් යන සූමු ඉහළ ස්ථර වල ඇතිවන ආයාදන තත්ත්වයයි. ලංඡන ආයා හෝ රෝරයේ සිනෑම සහ්ය යටතින් හෝ තුළ වශය හැඳුන්වයි.
- **රෝග කාරණය :** Molluscum contagiosum නම් මෛවරයය (ප්‍රේජ් 4ත් - 19). ii. වන ප්‍රොන්ඩ හිඩ් ආකාරීනයේ අතර බ්‍රැන්ල රෝග අති කරයි. ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බුද්ධීතාව වන්නේ ආකාරීනයේ, සමඟ සැපර්ඩ වෙළෙන් හෝ ආකාරීනයේ ව්‍යුහ පාවචව කරන ලද පැයිඩ්, තුව යොදායු හාවතායෙනි.
- **විෂේෂාංග කාලය :** සක් 2 සිට 8 ක පාලයක
- **රෝග ලක්ෂණය :** තැන්, සිනිපයයේ හෝ රාගියේ වෝ අති වේදනාවක ඇති නොකරන බිඛු හෝ ගෙවන් ලෙස නැඳුනා ගැන නැතිය. ගෙවන් වා මොලුවර 2 - 5 ක ව්‍යුහකම්නය ඇති සම්පෘති පානියට තුර බබුල වේ. සෙනුර වට සැක්ම කැසිම ඇති වේ.
- **සංකීර්ණය :** උච්චින ආයාදන ඇති විට, උච්චින 1/4 අතිවිම. HIV ආකාරීනයේ සහ ප්‍රොන්ඩ්නයේ හෝ ප්‍රොන්ඩ්නයේ සහ්ය ඇතිවිය.
- **රෝග විකිණ්වය :** ප්‍රධාන වශයෙන් සායනික වෝ විකිණ්ව තුනු ලබන අතර ද්‍රේකර අවස්ථා වලදී පෘත්‍රාක් පෘත්‍රාක් සහ PCR පරීක්ෂාව සිදු කෙරේ.
- **ප්‍රතිකරාර :** නියෝගී ප්‍රොන්ඩ්නයේ මෙම ආයාදන කාලයන් සමඟ ඉවුරු සූව වය නැතිය. ප්‍රතිකරාර ලෙස ගෙන් කරුම මගේ නො ලබන කිරීම. 70% - 90% TCA ආලේප කිරීම, තුළය් කිරීම, ව්‍යුහ විකින්සාව, 5% imiquimod ආලේප කිරීම යනාදිය සිදු කරයි.
- **වැදගත් ප්‍රෙලොස් :** සම්පුර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම පදනා සහ සිනිපයක් හෝ මය සිනිපයක් තෙවය නැතිය. රෝම ඉවත් කිරීම සහ පදනා වන්න සිරීම සහ තෙක් බම තිකා ස්වයු සම්පුළුණාය සිදු වය ඇතිය.

# මානව තුඩියක්ති උග්‍රතා වෛරසය

## Human Immunodeficiency Virus (HIV)



<b>H</b>	Human	මානව
<b>I</b>	Immunodeficiency	තුඩියක්ති උග්‍රතා
<b>V</b>	Virus	වෛරසය

**Test and treat is our policy**

## බානච පකිස්සකි උගාභා වෛරසය

### ● හැඳුන්වම :

අපොග් ගරීරයේ ප්‍රතිකෙකරණ පද්ධතියට හානිකරන ලංගුව සම්බුද්ධීය වන රෝගයකි. නිසි ප්‍රතිකාර නොවැනුහෙන් තානුකරණයෙන් ප්‍රතිකෙකින් උගාභා සහලෙක්මන (ප්‍රෝසි) තත්ත්වයට පත් වේ.

### ● රෝගකාරකය :

මානව ප්‍රතිකෙකින් උගාභා වෛරසය (එච්. ඇඩ්ව්/HIV)

### ● රෝග ලක්ෂණ :

**ජ්‍යාව්‍යික එච්.ඇඩ්ව් අක්‍රූහය :** වෛරසය අභ්‍යන්තරය වි පළමු මාස 6 ඇතුළත ක්‍රෘමයයි. බොහෝ විට (50-90%) ත් පෙන්න දෙනා ආකාරුතියෙන් සහ 2-4 ක් වැනි කාලයේදී වෛරසය වනි තෙරු ලක්ෂණ නොව ත් ලකාව පෙන්වයි. ගරුදයේ HIV වෛරසය මුළුමාය ඉතා අභ්‍යන්තර කොනොනු වෙත සම්බුද්ධීවන භාෂ්‍යය වැඩිය.

**කළුනිය එච්.ඇඩ්ව්. අක්‍රූහය :** මාස ගේ පෙන්න කළුනිය විට, මෙම වෛරසය තිදුණු නො අවශ්‍යක මැලුම්යි. මෙම ක්‍රෘමය තුළ රෝග යොම් ගැනීමෙන් තවත් කොනොනු පැතිරේම සිදුවෙයි. බොහෝ ආකාරුතියෙන් ප්‍රතිකාර තොවැඩ්වන්, සංකුලෙන අත් විදික්කීන් තොරව මේ අවධියේ ව්‍යාපාර ගොනාවක් පැවතුරුයි. කළු ගැනවන්ම බරපනාල රෝග නත්තුවෙන් ඇතිවය යාක.

**නිත්‍යරාශ්‍ය ප්‍රතිකෙකින් උගාභා සහලෙක්මන (ප්‍රෝසි) :** ටිං වැටුණු ප්‍රතිකෙකිනාරුන් පද්ධතිය සහිත වර්පනාල අවුරුදුයි. දිනෙන් දින වැටු ආකාරුන තත්ත්වයන් මතුවේ. රෝග කොනොනු වෙත සම්බුද්ධීය විටේ හානියාව අධිකර.

### ● සංකීර්ණතා :

රෝග තත්ත්වය තදනාවෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා කොටු තොටුනු නො මෙරුණා ඇත් විට සිදුවා හා සැලකා වනි ඉනා බරපනාල රෝග තත්ත්වයෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා සැලකා වනි ඉනා නැතියා ඇතියා.

# නියමීත ජුතිකර කදාන ගෙවූ නොවුණු හෝස් (කංඩුලතා)

කායනික  
අවදුක 2



කායනික  
අවදුක 3



කායනික  
අවදුක 4  
(ඒකින්)



## බාජට තුනියක් පොතා වෛරසය

- **රෝග ව්‍යිශේෂය :**  
මේ සඳහා පර්ත්‍රෙන එකකට වඩා භාවතා කරයි (HIV පර්ත්‍රෙන අනුපිළිවෙළ අනුව).
- **කුවල සමය -** රෝග ක්‍රාරකය ගරුරුත්වීමේ සිට පර්ත්‍රෙන්මෙනෙක් මගින් එය පෙන්වන දක්වා කාල පර්ත්‍රයයි. මෙය පර්ත්‍රෙන්මෙනෙක් පර්ත්‍රෙන්මෙනෙක් පූද්ගලයාගෙන නා පූද්ගලයාගෙන පූද්ගලයාගෙන වන අතර, මාස වැන් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු. නවතම HIV පර්ත්‍රෙන්මෙනා වල සැවුල සමය සහ හේ වහි කෙටි කාලයෙක් බවට පත්ව ඇත.
- **ප්‍රතිකාර :**  
මාස උතියක් ආනනා වෛරසය ආකෘතින තක්තවය ප්‍රති වෛරයෙක් මාසය මගින් පාලනය කළ හැකිය. මේවා ප්‍රති වෛරයෙක් සාම්බල වෛනි වෛරයෙක් ප්‍රති වෛනි ලබාගත නායු. එව් අයි. වි. සාම්බල පොතාන්නන්ට නිරෝග දී ආයුතාලයක් මෙය ලබා දෙයි. නොවරදා සාම්බල පොතාන්නේ මගින් සනකරුවනට ලංගකා සම්පූර්ණය විම වැළක්වා ගැන නායු.
- **රෝග වැළක්වා ගැනීම :**  
නියමන පරිදි ප්‍රතිකාර ලබාගනීමෙන්, තොගීනිය හැකි වෛරයෙක් ප්‍රතිච්චාගෙන්ම තුළේ සාම්බල වැළක්වනා ලැබා ගැනීමෙන් එක් ප්‍රති වැළක්වනා ගැනීමෙන් එක් තොගී වැළක්වනා සිං ද HIV පර්ත්‍රෙන්මෙනා තම අවබ්‍යාත අනුව නාවතා සිදුකළ හැකිය. නැකි සාම්බල වෛර රෝග නාවතා නාවතා අනුගමනය කරන අතර සාන්සරුවන් රෝග පර්ත්‍රෙන්මෙනා සාදනා කොටු කළ යුතුයි.
- **අයායිඩින් කොන්කර හෝ වෙන්කොට සාලේන් වෙන්ව හුරුවන ප්‍රලිගේන් සාමාජ තක්තවයක්, සාන්සාර හා සේවා ස්ථාන කොම්මුවට ශක්තිමත පර්ත්‍රයක් ඇති කළ යුතුයි.**

## **ප්‍රාසංග තේමුවාද කාකච්ච සිරිල කදුනා වැදගත් කරණය**

- ප්‍රාසංග ලබාගත්තීම :

නිර්දේශීත මාත්‍රාව, වේලාව සහ ලබ ගෙ දුනු තාල සිමාව පිළිබඳව රෝගීය දෙළුවන් වම ඉතා වැදගත්ය.

- ගබඩා කිරීම :

කාමර උත්සාහවලයේ දී සෘජ්‍යත භාර්ත්‍යනයන ගබඩා කළ යුතුය.

- දූෂණක වූ මාත්‍රාවක් ඇත්තේ :

ඉබට මාත්‍රාවන් මග පාර්ශ්වන් නම්, ඉබට මතක් වූ විශේෂ ගෙන්න. එය ඉබිගේ රුහු මාත්‍රාව සඳහා දූෂණක නේ නම්, මග පාර්ශ්ව මාත්‍රාව අන් නාර කුපුරුදු පර්දි බවේ රුහු මාත්‍රාව සමඟ ඉදිරියට යොනා. නිසි එමෙකක් මාත්‍රාවන් 2 තේ ඒකවර ලබ නොගන්න. ඉබට මොනෝ හට මාත්‍රාවන් අමතක බේ නම්, එය ඉබට මතක් කිරීමට ඇතැම්මක් සැකසීම උපකාර වේ.

- විශේෂ දාලකා යැලීම් :

(ගෝහ්‍යීනාවයු), මෙකර දීම, පිළිසිද ගැනීමේ පැකිසාව, නොමෝන උපන් පාහන තුම භාවිතය පිළිබඳව කාන්තාවන්ගෙන් වමසීම මෙන්ම දූෂණ ආනාර ආදියට ඇති අයාත්තකතා. දෙනට කාන්තා තරන බෙනාන් දූෂණ සහ රෙන්ති තැන්වා(දක්මා, චක්‍රුත්, ප්‍රාද රෝග) පිළිබඳව නොරුතුර බව ගෙන්ම ඉතා වැදගත්ය.

- ප්‍රාසංග වල අතියි බලපෑම් :

භාෂ්‍යඛීයෙන් දූෂණර දාඩාය සහ ප්‍රතිකාරයේ වාසි පිළිබඳව රෝගීය දෙනෙන් විය යුතාය.

- ප්‍රාවිතයට තරඟනාත්මක බලපෑම් :

එනා උර්ලන ව්‍යුත් සාම්ජනාත්මකය ඇතැබ මතින් ප්‍රාවිතයට තරඟනාත්මක වන අයාත්තකතා අයිත එය නැතිය (කැස්ට්‍රේ, සැම් කැස්ට්‍රේ, නොල් / දිව ඉදිහිම, ප්‍රාසංග ගෙන්මේ අපහසුත්තාව, බිජ්‍යා ටේඩ්නාව ආදිය). එහාති අයාත්තකතාවන් ඇති මුළුනොත් වහාම උගේ ඇති රෝගලට වොස් වෙවද්‍ය ප්‍රතිකාර බව ගෙ යුතුය.

## නිකර කාවච වන ප්‍රිජය වල දැක්ස හැකි අතුරු ආකෘති

ඉගැඟය	ප්‍රාලේඛ අනුරූප ආකෘති		
බොක්සියසිකලෝන්	අයුතිප ගේඩිය (ඉත්කාරය හෝ වමනය)	නිසරදය	ප්‍රාලේඛ, උරුවෙන්, ලුණෙන් වේදනාව
ආසිභෞතොසින්	අයුතිප ගේඩිය (ඉත්කාරය හෝ වමනය)	නිසරදය, කරනුවෙල්	ආනාර අරුවිය
කොරික්සෝ	ඉත්කාරය	නිලුවන ගේඩිය	ප්‍රාලේඛ ආනාරුව
ජ්ලුකනොයළු	අයුතිප ගේඩිය (ඉත්කාරය හෝ වමනය)	නිසරදය	උරුවෙන් වේදනාව, ප්‍රාලේඛ
මෙටුනයියෝල්	ඉත්කාරය හෝ වමනය	මුහුදය ලේඛනාවය රසය	ප්‍රාලේඛ ආනාරුව
ඒස්සික්ලොර	අයුතිප ගේඩිය (ඉත්කාරය හෝ වමනය)	නිසරදය, කරනුවෙල්	ප්‍රාලේඛ ආනාරුව
පෙනිසිලෝන්	එන්නත් කරන ස්වානායේ වේදනාව හෝ රඩු ප්‍රායෝගය	නිසරදය	ලුණු, මාංග පේරි වේදනාව සහ වේගවත් හැද ස්වානායුනාය

ලේඛක දුයෙනිවර

මෙදාන පිළාති රාජපක්ෂ  
මෙදාන වහැලිකා ජයග්‍රෑමී  
මෙදාන අපේක් කරනි  
මෙදාන මුරකා රාජපක්ෂ  
මෙදාන දිලේකා සොන්නාදර  
මෙදාන ශේනින්ද විපේක්ඝ  
මෙදාන හේම්න්ද උඩිසේකර  
මෙදාන වින්ද්‍යා පෙරේරා  
මෙදාන විම්පනි ගුණවර්ධන  
මෙදාන හාංචි තුම්බරින  
මෙදාන වාලිනා විරසින  
මෙදාන නදිරා තුම්බරින  
මෙදාන තුම්බරින  
මෙදාන නාලක සුලත්තාග  
පි.වි.අයි.සංප්‍රධාන මිය

